

# Saracen MAX

***Bez plevelů,  
bez starostí...***

**Dvousložkový herbicid pro dokonalé  
odplevelení obilnin na jaře**

- ◆ Aplikace od 3. listu až do objevení se praporcového listu obilnin
- ◆ Účinkuje na svízel, heřmánky, chrpu, mák vlčí, rozrazil, violky, výdrol řepky a další dvouděložné plevely
- ◆ Lze aplikovat v OP II. st. povrchových a podzemních vod
- ◆ Příznivá cena ošetření



# Saracen MAX

## Bez plevelů, bez starostí...

Dvousložkový postemergentní herbicid určený k likvidaci většiny jednoletých dvouděložných plevelů v ozimých a jarních obilninách.

**OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.**

### Působení přípravku

Saracen Max je přijímán listy a zelenými částmi rostlin. V rostlině je velice rychle rozváděn. Plevelé po zasažení postřikovou jíchou téměř okamžitě zastavují růst a dále již nekonkurují pěstované obilnině o vodu, živiny a světlo. První příznak herbicidní účinnosti se projeví do několika dní po aplikaci, kdy vegetační vrchol zesvětlá a prožloutne, plevelé vadnou a postupně odumírají až úplně zaschnou.

Saracen Max je také přijímán kořeny plevelů několik dní po aplikaci. Má krátké reziduální působení a je schopen kontrolovat vzcházející plevelé po aplikaci.

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování
Pšenice ozimá Ječmen ozimý Žito ozimé Triticale ozimé Oves ozimý	jednoleté dvouděložné plevelé	25 g/ha
Pšenice jarní Ječmen jarní Oves jarní	jednoleté dvouděložné plevelé	20–25 g/ha

**Saracen Max je všestranný herbicid, jehož jedinečné vlastnosti ocení každý pěstitel.**

### Doporučení pro aplikaci

#### Růstová fáze plodiny v době aplikace:

Ozimé obilniny - od 3. listu obilnin až do plně rozvinutého praporcového listu  
Jarní obilniny - od 2. listu obilnin až do objevení se 2. kolénka

#### Saracen Max - dávka 20 g/ha

- Plevelé v růstové fázi max. 4 pravých listů
- Pcháč oset v růstové fázi listové růžice
- Nízké teploty neovlivní herbicidní účinnost
- Tank mix s regulátory růstu – Limitar, CCC, fungicidy, listovými hnojivy

#### Saracen Max - dávka 25 g/ha

- Plevelé v růstové fázi max. 8 pravých listů
- Pcháč oset v růstové fázi počátek dlouhivého růstu
- Nízké teploty neovlivní herbicidní účinnost
- Tank mix s regulátory růstu - Limitar, CCC, fungicidy, listovými hnojivy

#### Saracen Max - dávka 25 g/ha + 0,05 l/ha Speedy

Při aplikaci na přerostlé plevelé v pozdějších růstových fázích obilniny doporučujeme použít smáčedlo Speedy pro rychlejší účinek i za zhoršených podmínek, především při silné voskové vrstvě na povrchu listů plevelů v období delšího sucha. Plevelé okamžitě po aplikaci přestanou růst, prožloutne vegetační vrchol a herbicidní účinek se projeví za několik týdnů po aplikaci.

### Spektrum účinnosti

**Plevelé citlivé:** svízel přítula - až do 10 přeslenů, heřmánky, výdrol řepky, všechny brukvovité plevelé, opletku, chrpu, máky, merlíky, laskavce, pomněnku, hluchavky, rozrazil, violky a pcháč.

**Plevelé méně citlivé:** zemědělym lékařský

Před použitím si přečtěte etiketu přípravku.